

PŘÍPRAVEK NA MYKÓZU NEHTŮ

CZ FUNGEX PŘÍPRAVEK NA MYKÓZU NEHTŮ

Klinicky ověřená léčba plísňových infekcí nehtů.

K čemu se používá: FungeX Přípravek na mykózu nehtů je zdravotnický prostředek určený k léčbě a prevenci plísňových infekcí nehtů (onychomykózy).

Aplikace: FungeX Přípravek na mykózu nehtů

- Klinicky prokázaná účinnost proti nehtovým plísním
- Pomáhá předcházet šíření a snižuje riziko opětovné infekce
- Zlepšuje vzhled nehtů (křehké, rýhované, zhrublé, drsné nebo odbarvené)
- Zjemňuje a vyživuje nehty
- Podporuje silnější a zdravější nehty
- Rychleschnoucí, neviditelný povrch – diskrétní každodenní použití

O plísňových infekcích nehtů:

- Plísňová infekce nehtů (onychomykóza):
- Je jednou z nejčastějších nemocí nehtů
 - Často začíná jako bílá nebo žlutá skvrna pod nehtem
 - Může způsobit zhrubnutí, křehkost, rýhy nebo změnu barvy
 - Může se rozšířit na další nehty a přenést se na ostatní osoby ve společných prostorách (např. bazény, tělocvičny)

Jak FungeX funguje: FungeX kombinuje antimykotický účinek s péčí o nehty:

- Ochranná vrstva:** vytváří prostředí nepříznivé pro růst plísní
- Barérová funkce:** zabráňuje šíření a opětovné infekci
- pH efekt:** snižuje kyselost nehtů, čímž zpomaluje rozvoj plísní.
- Se skvalenem** pro hladší a zdravěji vypadající nehty.

Pokyny k použití: Pouze k zevnímu použití. Aplikaci u dětí provádí dospělá osoba.

- Očistěte a osušte postižené nehty. Není třeba pilovat nehty.
- Aplikujte jednou denně kartáčkem. Pokryjte celou plochu nehtu a pokud možno i spodní stranu.
- Po každém použití pero nebo lahvičku znovu pevně uzavřete. Nechte 1–2 minuty zaschnout. Po použití si ihned umyjte ruce (kromě ošetřované oblasti).

Opakujte aplikaci každý den, dokud infikovaný nehet zcela nedoroste. Lze také aplikovat preventivně na zdravé nehty. Kartáček zůstává čistý a zabráňuje šíření plísní mezi nehty. Může se používat současně s perorální antimykotickou léčbou, pokud je předepsána.

Tip: Důslednost je klíčová. Příliš brzké ukončení léčby zvyšuje riziko recidivy.

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, obraťte se na lékaře

Užitečné tipy pro prevenci:

- Udržujte nohy v suchu, zejména mezi prsty
- Noste bavlněné nebo vlněné ponožky a denně je měňte
- Vyhnete se sdílení kleštíček na nehty, bot nebo ručníků
- Nechoďte bosí ve společných prostorách

Použití během těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před použitím s lékařem nebo lékárníkem.

Kontraindikace: Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou z uvedených složek. Nepoužívejte na otevřenou nebo poškozenou pokožku kvůli riziku podráždění nebo infekce. Před použitím se poraďte s lékařem, pokud trpíte cukrovkou, potížemi s krevním oběhem nebo oslabeným imunitním systémem.

Možné nežádoucí účinky: Vzácně: zarudnutí, podráždění, svědění, otok, bolest, uvolnění nehtů nebo alergické reakce (např. vyrážka).

Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pouze k zevnímu použití. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Nepoužívejte na otevřené rány nebo porušenou kůži. Ošetřené místo nebandážujte příliš těsně a nevystavujte ho teplu. Bezprostředně po aplikaci nevystavujte ošetřené nehty silnému slunečnímu záření.

Skladování: Skladujte v suchu při pokojové teplotě (5–25 °C). Vyhnete se vdechování výparů. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Obsah: 1 FungeX Přípravek na mykózu nehtů s 5 ml roztoku. Jedna lahvička o objemu 5 ml vystačí přibližně na 250 aplikací. Dostatečné množství pro několikaměsíční každodenní používání na jeden postižený nehet

Složení: Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Biotin

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ Výstražné značky a symboly na obalu a návodu k použití jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a správného používání tohoto výrobku a pro ochranu vás i ostatních osob před zraněním. Symboly jsou vysvětleny v následující tabulce:

Symbol	Vysvětlení
	Symbol pro výrobce
	Symbol, který značí, že je potřeba nahlédnout do návodu k použití
	Symbol, který značí, že při používání výrobku je třeba postupovat opatrně
	Symbol pro datum spotřeby
	Symbol, který značí, že se jedná o zdravotnický prostředek
	Symbol označující jedinečný identifikátor zařízení
	Symbol pro číslo šarže
	Nevhodné pro děti mladší 4 let
	Uchovávejte mimo dosah dětí
	Není určeno pro těhotné a kojící ženy
	Výrobek musí být skladován při teplotě 5 až 25 °C

Jakýkoli závažný incident, který se vyskytl v souvislosti s tímto výrobkem, by měl být nahlášen výrobcem a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel žije.

Obaly a použité díly zlikvidujte v souladu s předpisy dané země.

Výrobce
TheOTCclub
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Nizozemsko
www.theotclub.com

Distributor
Avepharma s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
www.avepharma.eu

CE 0482

V9773806
26B1_202510

PRÍPRAVOK NA MYKÓZU NECHTOV

SK FUNGEX PRÍPRAVOK NA MYKÓZU NECHTOV

Klinicky overená liečba infekcií nechtovej mykózy.

Na čo slúži: FungeX prípravok na mykózu nechtov je zdravotnícka pomôcka na liečbu a prevenciu infekcií nechtovej mykózy (onychomykózy).

Použitie: FungeX Prípravok na mykózu nechtov je:

- Klinicky preukázateľne účinný proti nechtovej mykóze
- Pomáha predchádzať šíreniu a znižuje riziko opätovnej infekcie
- Zlepšuje vzhľad nechtov (krehké, hrboľaté, zhrubnuté, drsné alebo so zmenenou farbou)
- Zjemňuje a vyživuje nechty
- Prispieva k silnejším a zdravším nechtom
- Rýchloschnúci, neviditeľný povrch – diskretne na každodenné používanie

Informácie o infekcii nechtovej mykózy: Infekcia nechtovej mykózy (onychomykóza):

- Je jednou z najčastejších ochorení nechtov
- Často začína ako biela alebo žltá škvrna pod nechtom
- Môže spôsobiť zhrubnutie, krehkosť, ryhy alebo zmenu farby
- Môže sa rozšíriť na ďalšie nechty a preniesť na ostatných v spoločných priestoroch (napr. bazény, telocvičňa)

Ako FungeX funguje: FungeX kombinuje antimykotický účinok so starostlivosťou o nechty:

- Ochranná vrstva: vytvára prostredie nepriaznivé na šírenie mykózy
- Funkcia bariéry: zabraňuje šíreniu a opätovnej infekcii
- Účinok pH: znižuje kyslosť nechtov, čím spomaľuje rozvoj mykózy.
- So skvalňaním na podporu hladších a zdravšie vyzerajúcich nechtov.

Návod na použitie: Len na externé použitie. Aplikáciu u detí smie vykonávať len dospelá osoba.

1. Očistite a osušte postihnutý necht (nechty). Nie je potrebné pilníkovanie nechtov.
2. Aplikujte raz denne štetcom, pričom pokryte celú plochu nechta a podľa možnosti aj jeho spodnú stranu.
3. Po každom použití pero alebo flastičku znovu riadne uzavrite. Nechajte schnúť 1 až 2 minúty. Po použití si ihneď umyte ruky (okrem ošetrovanej oblasti).

Pokračujte v každodennom používaní, kým infikovaný necht úplne neopadne. Môže sa aplikovať aj preventívne na zdravé nechty. Štetec zostáva čistý a zabraňuje šíreniu mykózy medzi nechtami. Môže sa používať spolu s perorálnou antimykotickou liečbou, ak je predpísaná.

Tip: Kľúčom k úspechu je dôslednosť. Predčasné ukončenie liečby zvyšuje riziko recidívy.

Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte zdravotníckeho pracovníka

Užitočné tipy na prevenciu:

- Udržujte nohy v suchu, najmä medzi prstami
- Noste bavlnené alebo vlnené ponožky a každý deň si ich meňte
- Vyhňte sa spoločnému používaniu nožničiek na nechty, topánok alebo uterákov
- V spoločných priestoroch nechodte naboso

Používanie počas tehotenstva a kojenia: Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti. Ak ste tehotná alebo kojíte, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom.

Kontraindikácie: Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorú z uvedených zložiek. Neaplikujte na otvorenú alebo poškodenú pokožku pretože existuje riziko podráždenia alebo infekcie. Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak máte cukrovku, zlý krvný obeh alebo oslabený imunitný systém.

Možné vedľajšie účinky: Zriedkavé: začervenanie, podráždenie, svrbenie, opuch, bolesť, odpadnutie nechtu alebo alergická reakcia (napr. vyrážka). Ak sa vyskytne alergická reakcia, ihneď prestaňte pomôcku používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Len na externé použitie. Zabráňte kontaktu s očami a sliznicou. Neaplikujte na otvorené rany alebo poškodenú pokožku. Ošetrovanú oblasť pevne neobvážujte ani nezahrievajte. Bezprostredne po aplikácii nevystavujte ošetrované nechty silnému slnečnému žiareniu.

Skladovanie: Uchovávať v suchu pri izbovej teplote (5 až 25 °C). Zabráňte vdychovaniu výparov. Uchovávať mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.

Obsahuje: 1 FungeX Prípravok na mykózu nechtov s 5 ml roztoku. Jedna 5 ml flastička poskytuje približne 250 aplikácií. Postačuje na niekoľko mesiacov každodenného používania na jeden postihnutý necht

Zložky: Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Biotin

VYSVETLIVKY SYMBOLOV Výstražné značky a symboly na obale a návod na použitie sú nevyhnutné na zaistenie bezpečného a správneho použitia tohto výrobku a na ochranu vás a ostatných pred zranením. Symboly sú vysvetlené v tabuľke nižšie:

Symbol	Vysvetlivka
	Symbol výrobcu
	Symbol, ktorý označuje, že si treba prečítať návod na použitie
	Symbol, ktorý označuje, že pri používaní zdravotníckej pomôcky je potrebná opatrnosť
	Symbol pre dátum expirácie
	Symbol, ktorý označuje, že tovar je zdravotnícka pomôcka
	Symbol, ktorý označuje unikátny identifikátor pomôcky
	Symbol pre číslo šarže
	Nevhodné pre deti do 4 rokov
	Uchovávať mimo dosahu detí
	Nevhodné pre tehotné ženy a počas kojenia
	Výrobok skladujte pri teplote od 5 °C do 25 °C

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto výrobkom, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

Obal a použité časti zlikvidujte podľa platných predpisov danej krajiny.

Ďalšie informácie o spoločnosti FungeX nájdete na www.fungex.com. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte distribútora.

Výrobca
TheOTclub
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Hollandsko
www.theotclub.com

Distribútor
Avepharma s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
www.avepharma.eu

CE 0482

V9773806
26B1_2025.10